

## Лекция 2

### §2. Степенни редове

**1. Редици и редове от функции.** Нека функциите  $f_n(x)$ ,  $n=1,2,\dots$ , са определени над едно общо дефиниционно множество  $D \subseteq \mathbb{R}$ . По този начин получаваме редица от функции  $\{f_n(x)\}$ . Свойствата на редиците от функции са аналогични на свойствата на числовите редици, понеже при всяко фиксирано  $x_0 \in D$ , редицата  $\{f_n(x_0)\}$  представлява обикновена числова редица.

Например редицата от функции  $f_n(x) = \frac{\cos nx}{n}$  е определена за всяко  $x$ ,  $D = \mathbb{R}$ .

При  $x_0 = \pi$  се получава числовата редица  $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\}$ , която е сходяща и клони към нула.

Нека  $E \subseteq D$  е множеството от точки, над които редицата  $\{f_n(x)\}$  е сходяща. При различните  $x \in E$  се получават различни граници, които зависят от  $x$ . По този начин се определя граничната функция  $f(x): E \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in E.$$

която се явява **поточкова** граница на редицата  $\{f_n(x)\}$ .

Например редицата с общ член  $f_n(x) = \sin x + \frac{x}{x^2 + n}$ , която е определяна за всяко  $x \in \mathbb{R}$ , има поточкова граница  $f(x) = \sin x$ , понеже

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sin x + \frac{x}{x^2 + n} \right) = \sin x + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + n} = \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Сходимостта на редицата  $\{f_n(x)\}$  в точката  $x_0 \in E$  означава, че за всяко  $\varepsilon > 0$  може да се намери  $n_0$  такава, че  $|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$  при всяко  $n > n_0$ . Една числова редица е сходяща точно когато е фундаментална, което е съдържанието на условието за сходимост на Коши. Редицата  $\{f_n(x)\}$  е сходяща в точката  $x_0 \in E$ , когато за всяко  $\varepsilon > 0$  съществува  $n_0$  такава, че  $|f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon$  при всяко  $n > n_0$  и всяко естествено  $p$ .

Особено значение в теорията има въпроса за свойствата на граничната функция  $f(x)$  в съответствие със свойствата на общия член на редицата  $f_n(x)$ . За да може граничната функция да съхрани свойствата на общия член се нуждаем от по-силен вид сходимост, която се нарича равномерна сходимост.

**Определение 2.1.** Казва се, че редицата  $\{f_n(x)\}$  клони **равномерно** към границата  $f(x)$  над множеството  $E$ , когато за всяко  $\varepsilon > 0$  може да се намери  $n_0$  такава, че  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ , за всяко  $n > n_0$  и всяко  $x \in E$ . Казва се, че редицата  $\{f_n(x)\}$  е равномерно фундаментална над множеството  $E$ , когато за всяко  $\varepsilon > 0$  може да се намери  $n_0$  такава, че  $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ , за всяко  $n > n_0$ , всяко естествено число  $p$  и всяко  $x \in E$ . ■

Разликата между поточковата сходимост и равномерната сходимост в общия случай е твърде съществена. Равномерната сходимост означава сходимост по един и същ начин (с една и съща "скорост") във всяка точка от множеството на сходимост.

Например редицата с общ член  $f_n(x) = \sin x + \frac{1}{x^2 + n}$  клони равномерно към границата  $f(x) = \sin x$  над  $E = \mathbb{R}$ . Имаме

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{x^2 + n} \leq \frac{1}{n}, \quad x \in \mathbb{R},$$

следователно при дадено  $\varepsilon > 0$  можем да изберем едно  $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$ , при което за всяко  $n > n_0$  и всяко  $x \in \mathbb{R}$  е изпълнено

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon.$$

Да разгледаме сега редицата  $f_n(x) = x^n$  над дефиниционното множество  $D = [0, 1]$ . При  $0 \leq x < 1$  имаме  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ , а при  $x = 1$ , очевидно  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$ . Следователно редицата  $\{x^n\}$  клони поточково над интервала  $[0, 1]$  към граничната функция

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{за } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{за } x = 1 \end{cases}$$

Тази сходимост обаче не е равномерна, понеже при всяко  $\varepsilon > 0$ , за което  $\varepsilon < 1$ , условието

$$|f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon,$$

се нарушава за всяко  $x$ , достатъчно близко до 1.

**Твърдение 2.1.** Редицата  $\{f_n(x)\}$  е равномерно сходяща над  $E$  тогава и само тогава, когато е равномерно фундаментална.

*Доказателство.* Нека  $\{f_n(x)\}$  е равномерно сходяща над  $E$  към граничната функция  $f(x)$  и нека  $\varepsilon > 0$ . Тогава съществува  $n_0$  такава, че  $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ , за всяко  $n > n_0$  и всяко  $x \in E$ . Тогава при всяко  $n > n_0$ , всяко естествено  $p$  и всяко  $x \in E$  е изпълнено

$$|f_{n+p}(x) - f(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

което доказва равномерната фундаменталност на  $\{f_n(x)\}$ . Да предположим сега, че редицата  $\{f_n(x)\}$  е равномерно фундаментална. Тогава при всяко  $x_0 \in E$  е фундаментална, следователно сходяща във всяка точка  $x_0 \in E$ . Да означим с  $f(x)$  поточковата граница на редицата  $\{f_n(x)\}$ . Ще докажем, че  $f(x)$  се явява и равномерна граница за редицата  $\{f_n(x)\}$ . Нека  $\varepsilon > 0$ . По условие съществува  $n_0$  такава, че

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

за всяко  $n > n_0$ , всяко естествено  $p$  и всяко  $x \in E$ . След граничен преход при  $p \rightarrow \infty$ , от последното неравенство получаваме, че за всяко  $n > n_0$  и всяко  $x \in E$  е в сила

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

което означава равномерна сходимост на редицата  $\{f_n(x)\}$ . ■

Равномерната сходимост позволява на граничната функция да наследи свойството непрекъснатост.

**Теорема 2.1.** Нека редицата от непрекъснати функции  $\{f_n(x)\}$ , определени над ограничения затворен интервал  $[a, b]$ , клони равномерно към функцията  $f(x)$ . Тогава граничната функция  $f(x)$  е непрекъсната в  $[a, b]$ .

*Доказателство.* Нека  $\varepsilon > 0$ . Съгласно определението за равномерна сходимост, може да се намери  $n_0$  такава, че

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

за всяко  $n > n_0$  и всяко  $x \in [a, b]$ . Да фиксираме едно  $n_1 > n_0$ . Функцията  $f_{n_1}(x)$  е непрекъсната над ограничения затворен интервал  $[a, b]$ , следователно се явява и равномерно непрекъсната. От равномерната непрекъснатост следва съществуването на  $\delta > 0$  такава, че

$$|f_{n_1}(x) - f_{n_1}(y)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

винаги когато  $|x - y| < \delta$ ,  $x, y \in [a, b]$ . Нека  $x$  и  $y$  са избрани от последните две условия.

Тогава

$$|f(x) - f(y)| = |(f(x) - f_{n_1}(x)) + (f_{n_1}(x) - f_{n_1}(y)) + (f_{n_1}(y) - f(y))|,$$

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_{n_1}(x)| + |f_{n_1}(x) - f_{n_1}(y)| + |f_{n_1}(y) - f(y)|,$$

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

което по определение означава, че граничната функция  $f(x)$  се явява равномерно непрекъсната над интервала  $[a, b]$ . ■

Последната теорема показва, че метричното пространство  $C[a, b]$  на непрекъснатите над ограничения затворен интервал  $[a, b]$  функции е пълно относно равномерната метрика

$$\rho(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|.$$

Равномерната сходимост позволява да се извърши *граничен преход под знака на интеграла*.

**Теорема 2.2.** Нека редицата от непрекъснати функции  $\{f_n(x)\}$ , определени над ограничения затворен интервал  $[a, b]$ , клони равномерно към функцията  $f(x)$ . Тогава е в сила равенството

$$(2.1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

*Доказателство.* Нека  $\varepsilon > 0$ . От определението за равномерна сходимост следва съществуването на  $n_0$  такава, че

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b - a},$$

при всяко  $n > n_0$  и всяко  $x \in [a, b]$ . Сега от основните свойства на интеграла получаваме

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b [f_n(x) - f(x)] dx \right| \leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{b - a} dx = \frac{\varepsilon}{b - a} \int_a^b dx = \varepsilon,$$

при всяко  $n > n_0$ , което по определение означава, че е изпълнено граничното съотношение (2.1). ■

Например

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \left( \sin x + \frac{1}{x^2 + n} \right) dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = 2.$$

Равномерната сходимост позволява при определени условия граничната функция да наследи и свойството диференцируемост.

**Теорема 2.3.** Нека редицата от непрекъснати функции  $\{f_n(x)\}$ , определени над ограничения затворен интервал  $[a, b]$ , клони равномерно към функцията  $f(x)$ , а редицата от техните производни  $\{f'_n(x)\}$ , за които се предполага също, че са непрекъснати функции над  $[a, b]$ , клони равномерно към функцията  $g(x)$ . Тогава граничната функция  $f(x)$  е диференцируема в  $[a, b]$ , при което  $f'(x) = g(x)$ .

*Доказателство.* Съгласно теорема 2.2, граничните функции  $f(x)$  и  $g(x)$  са непрекъснати. Да изберем едно  $c \in (a, b)$ . Съгласно основната теорема на Нютон-Лайбниц е в сила равенството

$$f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t) dt.$$

Да фиксираме едно  $x \in [a, b]$  и да направим граничен преход в последното равенство. От теорема 2.3 получаваме

$$f(x) = f(c) + \int_c^x g(t) dt.$$

Сега от правилото за диференциране на интеграла като функция на горната си граница намираме, че  $f'(x) = g(x)$ , което доказва теоремата. ■

Нека функциите  $u_n(x)$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , са определени над едно общо дефиниционно множество  $D \subseteq \mathbb{R}$  и да разгледаме реда от функции

$$(2.2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ с частични суми } s_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

Свойствата на функционните редове са аналогични на свойствата на числовите редове, понеже при всяко фиксирано  $x_0 \in D$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$$

представлява обикновен числов ред. Нека  $E \subseteq D$  е множеството от точки, над които редът (2.2) е сходящ. При различните  $x \in E$  се получават различни граници, които зависят от  $x$ . По този начин се определя граничната функция  $s(x): E \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad x \in E.$$

която се явява **поточкова** граница на реда (2.2). Всички видове сходимости при редовете се дефинират посредством съответната сходимост на редицата от частичните суми  $\{s_n(x)\}$ . По тази причина, получените резултати за свойствата на редиците от функции се пренасят непосредствено върху функционните редове. Съгласно определенията

$$s(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x), \quad x \in E.$$

**Определение 2.2.** Казва се, че редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  клони равномерно към границата  $s(x)$  над множеството  $E$ , когато редицата от частичните суми  $\{s_n(x)\}$  клони равномерно към  $s(x)$  над  $E$ . ■

В този случай функцията  $s(x)$  се явява сума на реда. Редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  се нарича **абсолютно сходящ** над множеството  $E$ , когато е сходящ редът  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ . Очевидно ако един ред е абсолютно сходящ над дадено множество, то той е и сходящ над същото множество.

Следващите твърдения са непосредствени следствия от определенията и от съответните твърдения за редици от функции.

**Твърдение 2.2.** Нека функциите  $u_n(x)$  са непрекъснати над интервала  $[a, b]$ , а редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  е равномерно сходящ към  $s(x)$  над  $[a, b]$ . Тогава сумата на реда  $s(x)$  се явява непрекъсната функция. ■

Доказателството на твърдение 2.2 следва от теорема 2.1.

**Твърдение 2.3.** Нека функциите  $u_n(x)$  са непрекъснати над интервала  $[a, b]$ , а редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  е равномерно сходящ към  $s(x)$  над  $[a, b]$ . Тогава е в сила равенството

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \int_a^b s(x) dx. \quad \blacksquare$$

Твърдение 2.3 представлява правилото за граничен преход под знака на интеграла за редове (**почленно интегриране**), а неговото доказателство следва от теорема 2.2.

**Твърдение 2.4** Нека функциите  $u_n(x)$  и техните производни  $u_n'(x)$  са непрекъснати над интервала  $[a, b]$ . Нека освен това редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  е равномерно сходящ към  $s(x)$  над  $[a, b]$ , а редът от производните  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$  е равномерно сходящ към  $g(x)$  над  $[a, b]$ . Тогава сумата на реда  $s(x)$  е диференцируема функция, при което за нейната производна имаме  $s'(x) = g(x)$ . ■

Твърдение 2.4 представлява правилото за **почленно диференциране** при редове, понеже неговото заключение може да се запише във вида

$$\left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x),$$

а неговото доказателство следва от теорема 2.3.

Според твърдение 2.1, равномерната сходимост на реда (2.2), означава равномерна фундаменталност на редицата от частичните суми  $\{s_n(x)\}$ . По този начин получаваме следния критерий за равномерна сходимост, който може да се схваща и като определение.

**Твърдение 2.5 (Коши).** Редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  е равномерно сходящ над множеството

$E$  тогава и само тогава, когато за всяко  $\varepsilon > 0$  може да се намери  $n_0$  такава, че

$$|s_{n+p}(x) - s_n(x)| = |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon,$$

при всяко  $n > n_0$ , всяко естествено  $p$  и всяко  $x \in E$ . ■

Установяването на равномерната сходимост на даден ред в много от случаите се получава от следната важна

**Теорема 2.4 (Вайерщрас).** Нека функциите  $u_n(x)$  са определени над множеството  $E$ , при което е изпълнено  $|u_n(x)| \leq \alpha_n$ ,  $x \in E$ , а редът с положителни членове  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$  е сходящ. Тогава редът  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  е равномерно (и абсолютно) сходящ над множеството  $E$ .

*Доказателство.* Нека  $\varepsilon > 0$ . От сходимостта на реда  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$  следва

съществуването на  $n_0$  такава, че

$$|\alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \dots + \alpha_{n+p}| < \varepsilon,$$

при всяко  $n > n_0$  и всяко естествено  $p$ . Нека  $s_n(x)$  са частичните суми на реда от

абсолютните стойности на общия член на  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ,

$$s_n(x) = |u_1(x)| + |u_2(x)| + \dots + |u_n(x)|.$$

От горното веднага получаваме

$$|s_{n+p}(x) - s_n(x)| = |u_{n+1}(x)| + |u_{n+2}(x)| + \dots + |u_{n+p}(x)| \leq \alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \dots + \alpha_{n+p} < \varepsilon,$$

при всяко  $n > n_0$ , всяко естествено  $p$  и всяко  $x \in E$ , което съгласно твърдение 2.5

означава равномерна и абсолютна сходимост на реда  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ . ■

Критерият на Вайерщрас се оказва твърде ефективен в много разнообразни ситуации, независимо от своята простота.

**2. Степенни редове.** Редът от функции

$$(2.3) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-\mu)^n = a_0 + a_1(x-\mu) + a_2(x-\mu)^2 + \dots + a_n(x-\mu)^n + \dots$$

се нарича **степенен ред** с център в точката  $\mu$  и коефициенти  $a_n$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ . Множеството на сходимост  $E$  на реда (2.3) не е празно, понеже винаги съдържа поне точката  $\mu$ .

Степенните редове представляват непосредствено обобщение на полиномите, понеже всеки полином може да се разглежда като степенен ред, в който само краен брой от коефициентите е различен от нула. Степенните редове, при определени условия, представляват и непосредствено обобщение на представянето на дадена функция посредством формулата на Тейлър. Степенните редове представляват едно от най-важните понятия за цялата математика.

Например да разгледаме степенния ред

$$(2.4) \quad f(x) = 1 + (x-\mu) + (x-\mu)^2 + \dots + (x-\mu)^n + \dots$$

Съгласно правилото за сумиране на геометрична прогресия, при  $|x - \mu| < 1$  редът (2.4) представлява функцията

$$f(x) = \frac{1}{1 - (x - \mu)}.$$

При кое да е  $x$ , за което  $|x - \mu| \geq 1$ , редът (2.4) е разходящ, понеже общият му член  $(x - \mu)^n$  не клони към нула. По този начин множеството  $E$ , над което редът (2.4) е сходящ, се определя от условието  $E: |x - \mu| < 1$ , което задава интервал  $(\mu - 1, \mu + 1)$  с център в точката  $\mu$  и радиус  $R = 1$ . В общия случай се наблюдава същата закономерност. Следващата важна теорема привеждаме без доказателство.

**Теорема 2.5 (Абел).** За всеки степенен ред (2.3) съществува някакво число  $R \geq 0$  (или  $R = \infty$ ) такова, че редът е абсолютно сходящ за всяко  $x$  от интервала  $(\mu - R, \mu + R)$  и разходящ за всяко  $x$ , за което  $|x - \mu| > R$ . В този случай  $R$  се нарича **радиус на сходимост** на степенния ред. Освен това, ако  $R > 0$ , то редът е равномерно и абсолютно сходящ над всеки ограничен затворен интервал  $[a, b] \subset (\mu - R, \mu + R)$ . ■

За примера (2.4) намерихме  $R = 1$ . Радиусът на сходимост може да бъде намерен с помощта на **формулата на Адамар**,

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}},$$

където  $\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$  е най-голямата точка на съгъстяване за редицата  $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$ . В повечето случаи обаче радиусът на сходимост се пресмята въз основа на следното

**Твърдение 2.6.** Нека съществува някоя от границите  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$  или  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ . Тогава  $R = \frac{1}{l}$ , при което ако  $l = 0$ , то  $R = \infty$ , и ако  $l = \infty$ , то  $R = 0$ .

*Доказателство.* Нека съществува границата  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ . Да фиксираме едно  $x$  и да разгледаме степенния ред

$$(2.5) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - \mu)^n$$

като числов с общ член  $u_n = a_n (x - \mu)^n$ . От условието следва съществуването на границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = |x - \mu| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l|x - \mu|.$$

Сега от критерия на Коши следва, че при  $l|x - \mu| < 1$  редът е абсолютно сходящ, а при  $l|x - \mu| > 1$  редът е разходящ, понеже общият му член не клони към нула. По този начин получихме, че величината  $\frac{1}{l}$  има следното свойство. При  $|x - \mu| < \frac{1}{l}$  редът е абсолютно сходящ, а при  $|x - \mu| > \frac{1}{l}$  редът е разходящ. Единствената величина, с това свойство

обаче е радиусът на сходимост на реда, следователно  $R = \frac{1}{l}$ . Нека съществува

границата  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ . Тогава съществува границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-\mu)^{n+1}}{a_n(x-\mu)^n} \right| = |x-\mu| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l|x-\mu|.$$

Сега доказателството се завършва по същия начин, само че вместо критерия на Коши се използва критерия на Даламбер. ■

Например степенният ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^n}$$

има радиус на сходимост  $R = 2$ , понеже

$$a_n = \frac{1}{2^n} \text{ и } l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2}.$$

Редът

$$(2.6) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$$

има радиус на сходимост  $R = 1$ , понеже

$$a_n = \frac{1}{n} \text{ и } l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

Нека  $0 < R < \infty$ . От теорема 2.5 знаем, че в интервала  $(\mu - R, \mu + R)$  степенният ред е абсолютно сходящ, а в интервалите  $(-\infty, \mu - R)$  и  $(\mu + R, \infty)$  редът е разходящ. Теорема 2.5 не уточнява поведението на реда в двата края на интервала  $\mu - R$  и  $\mu + R$ . В общия случай съществуват редове, за които се реализират всичките възможности за сходимост или разходимост по краищата на въпросния интервал. Например за реда (2.6), с център  $\mu = 3$ , вече установихме, че  $R = 1$ , от което следва, че при  $x \in (\mu - R, \mu + R) = (2, 4)$  редът е абсолютно сходящ, а при  $x \notin [2, 4]$  редът е разходящ, понеже общият му член не клони към нула. В десния край  $x = 4$  на интервала получаваме хармоничния числовия ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

за който вече установихме, че е разходящ. В левия край  $x = 2$  на интервала получаваме числовия ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

който е условно сходящ, съгласно критерия на Лайбниц.

Степенните редове с ненулев радиус на сходимост допускат **почленно интегриране** въз основа на клаузата за равномерна сходимост от теорема 2.5.

Например редът  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$  има радиус на сходимост  $R = 1$ , при  $|x| < 1$  неговата сума  $\frac{1}{1-x}$

се намира от формулата за геометрична прогресия, следователно можем да напишем

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad |t| < 1.$$



Да разгледаме едно  $x$ ,  $|x| < 1$ . Тогава горният ред е равномерно сходящ в интервала  $[0, x]$  и можем да приложим почленно интегриране, след което намираме

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n dt, \quad |x| < 1,$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1.$$

По този начин в частност получихме развитието на функцията  $\ln(1-x)$  в степенен ред около нулата.

Степенните редове с ненулев радиус на сходимост допускат **почленно диференциране**. Резултатът от почленно диференциране на даден степенен ред е отново степенен ред със същия радиус на сходимост.

**Теорема 2.6.** Нека  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-\mu)^n$  е степенен ред с ненулев радиус на сходимост,  $R > 0$ . Тогава неговата сума  $f(x)$  има производни от всеки ред в отворения интервал  $(\mu - R, \mu + R)$ , които производни се получават посредством почленно диференциране. Получените от това диференциране степенни редове имат същия радиус на сходимост  $R$ . ■

От тази теорема следва, че

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-\mu)^{n-1},$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-\mu)^{n-2},$$

$$f'''(x) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) a_n (x-\mu)^{n-3} \text{ и т.н.}$$

Като пример за приложение на теорема 2.6 да намерим сумата на реда

$$(2.7) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

За този ред имаме

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1,$$

следователно  $R = \frac{1}{l} = 1$ . От теорема 2.6 следва, че функцията  $f(x)$  има производни от всеки ред за  $x \in (-1, 1)$ , които могат да бъдат намерени посредством почленно диференциране. След диференциране (2.7) приема вида

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$$

Последното записваме във вида

$$f'(t) = \frac{1}{1-t}, \quad |t| < 1,$$

и интегрираме в граници от 0 до  $x$ ,  $|x| < 1$ . Получаваме

$$\int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-t) \Big|_0^x = -\ln(1-x).$$

От друга страна

$$\int_0^x f'(t) dt = \int_0^x df(t) = f(t) \Big|_0^x = f(x) - f(0) = f(x),$$

понеже  $f(0) = 0$ . Така получаваме

$$f(x) = -\ln(1-x), \quad |x| < 1.$$

Да разгледаме отново степенния ред

$$(2.8) \quad f(x) = a_0 + a_1(x-\mu) + a_2(x-\mu)^2 + a_3(x-\mu)^3 + \dots + a_n(x-\mu)^n + \dots,$$

за който предполагаме ненулев радиус на сходимост,  $R > 0$ . Замествайки  $x = \mu$  получаваме  $a_0 = f(\mu)$ . След диференциране намираме

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-\mu) + 3a_3(x-\mu)^2 + \dots + na_n(x-\mu)^{n-1} + \dots.$$

Замествайки  $x = \mu$  получаваме  $a_1 = f'(\mu)$ . Като диференцираме отново намираме

$$f''(x) = 2a_2 + 6a_3(x-\mu) + \dots + n(n-1)a_n(x-\mu)^{n-2} + \dots.$$

Замествайки  $x = \mu$  получаваме  $a_2 = \frac{1}{2}f''(\mu)$ . Продължавайки аналогично получаваме верността на

**Теорема 2.7.** Нека  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-\mu)^n$  е степенен ред с ненулев радиус на сходимост,  $R > 0$ . Тогава за неговите коефициенти е в сила формулата

$$a_n = \frac{f^{(n)}(\mu)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

следователно редът може да се запише във вида

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\mu)}{n!} (x-\mu)^n,$$

$$(2.9) \quad f(x) = f(\mu) + f'(\mu)(x-\mu) + \frac{f''(\mu)}{2}(x-\mu)^2 + \frac{f'''(\mu)}{6}(x-\mu)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(\mu)}{n!}(x-\mu)^n + \dots,$$

при което редът (2.9) е абсолютно и равномерно сходящ над всеки ограничен затворен интервал  $[a, b] \subset (\mu - R, \mu + R)$ . ■

Степенният ред във вида (2.9) представлява непосредствено обобщение на развитието на дадена функция посредством формулата на Тейлър около точката  $\mu$ .

Например за функцията  $f(x) = e^x$  имаме следното развитие около нулата

$$(2.10) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^6}{720} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots.$$

За реда (2.10) имаме

$$a_n = \frac{1}{n!} \quad \text{и} \quad l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

следователно  $R = \frac{1}{l} = \infty$ . При  $\mu = 0$  степенният ред се нарича още *ред на Маклорен*.

Разсъждавайки аналогично, получаваме следните маклоренови развития

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots, \quad R = \infty,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots, \quad R = \infty,$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots, \quad R=1,$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} x^3 + \dots, \quad R=1.$$

Два степенни реда с един и същ център  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-\mu)^n$  и  $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-\mu)^n$  и радиуси на сходимост  $R_f > 0$  и  $R_g > 0$  могат да се **събират почленно**, при което се получава степенен ред  $h(x) = f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) (x-\mu)^n$  с радиус на сходимост  $R_h = \min(R_f, R_g)$ . Резултатът от тяхното умножение отново представлява степенен ред  $f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-\mu)^n$ , където за коефициентите  $c_n$  е в сила **конволюционната формула**

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Тази формула се получава естествено след "разкриване на скобите" и групиране на събираемите с равни степени на променливата  $(x-\mu)$ .

Съгласно една теорема на Абел, даден степенен ред представлява непрекъснатата функция в целия интервал на сходимост  $\langle \alpha, \beta \rangle$ , независимо от това дали краищата на този интервал принадлежат или не на самия интервал. Вече знаем развитието на функцията  $\ln(1+x)$  около нулата

$$(2.11) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots.$$

От друга страна редът е (условно) сходящ за  $x=1$  и разходящ за  $x=-1$ , следователно неговият интервал на сходимост е  $(-1, 1]$ . От теоремата на Абел следва, че редът (2.11) задава непрекъснатата (отляво) функция в точката  $x=1$ , откъдето след граничен преход при  $x \rightarrow 1-0$  намираме интересното равенство

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots.$$